UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

UFSC

PROVAB
PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA

Módulo
Eventos Agudos em Saúde Bucal

Dor de origem endodôntica

Anexo B

FLORIANÓPOLIS
UFSC
2014

ANEXO B

Quando se trata de pericementite apical infecciosa, é indicado o uso sistêmico de antibióticos, pois há uma infecção presente. Entretanto, não se esqueça de que a dor também pode estar presente. Assim, o tratamento medicamentoso deve ser feito com analgésicos ou, ainda, com anti-inflamatórios, como aqueles descritos no ANEXO A. A seguir, você encontrará várias opções de antibióticos e, também, um protocolo de uso para facilitar o seu trabalho.

Penicilinas

Constituem-se como a primeira opção diante de infecções odontogênicas. No entanto, você deve ficar atento, pois existem outras opções que podem ser a solução quando o usuário relata ser alérgico a penicilina.

a) **Penicilinas V:**

Quadro 5 – Penicilinas V

Penicilinas V
Dosagem e administração
Comprimidos de 500.000 UI*. Adultos: administrar 1 comprimido por via oral de 6 em 6 horas.
Comprimidos de 1.200.000 UI*. Adultos: administrar 1 comprimido por via oral de 8 em 8 horas.
* **Observação**: 1.600 UI correspondem a 1mg.

b) **Penicilinas de amplo espectro:**

Quadro 6 – Penicilinas de amplo espectro

Penicilinas de amplo espectro	
Medicamento	Dosagem e administração
Ampicilina	Cápsulas de 250mg e 500mg; comprimidos de 250mg, 500mg e 1000mg. Adultos: tanto para cápsulas como para comprimidos, prescrever 1 a 2 g/dia, dividida em 4 administrações.
	Injetável, 500mg e 1 grama. Adultos: 1 a 2 g/dia, dividida em 4 administrações.
Amoxicilina*	Cápsulas de 500mg; comprimidos de 875mg e 1000mg. Adultos: 1 cápsula ou 1 comprimido de 8 em 8 horas.
Metampinicilina	Cápsulas de 500mg. Adultos: 1 cápsula de 8 em 8 horas.
	Injetável, 500mg. Adultos: 1 ampola via intramuscular a cada 8 horas.
Amoxicilina/Ácido clavulânico*	Comprimidos de 500mg de amoxicilina + 125mg de clavulanato de potássio; comprimidos de 875mg de amoxicilina + 125mg de clavulanato de potássio. Adultos: administrar 1 comprimido de 8 em 8 horas.
	Injetável, frasco-ampola de 500mg de amoxicilina + 100mg de clavulanato de potássio; injetável, frasco-ampola de 1000mg de amoxicilina + 200mg de clavulanato de potássio. Adultos: administrar 1 frasco-ampola de 8 em 8 horas.
* Somente amoxicilina e amoxicilina e ácido clavulânico constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, do Ministério da Saúde.	

Cefalosporinas

As cefalosporinas são mais uma opção diante de infecções odontogênicas, entretanto, não devem ser prescritas para indivíduos que relatam ser alérgicos à penicilina.

Quadro 7 – Cefalosporinas

Cefalosporinas	
Medicamento	**Dosagem e administração**
Cefalexina*	Drágeas de 500mg; cápsulas de 500mg; comprimidos de 500mg. Adultos: administrar 1 drágea, 1 cápsula ou 1 comprimido a cada 8 horas.
Cefazolina	Injetável, frasco-ampola de 250mg, 500mg e 1000mg. Adultos: administrar 250mg ou 500mg por via intramuscular de 8 em 8 horas.
Cefotaxima*	Injetável, 500mg e 1000mg. Adultos: administrar, por via intramuscular, de 1g a 2g ao dia, dividida em 2 administrações.
Cefalotina	Injetável, frasco-ampola com 1000mg. Adultos: administrar, por via intramuscular, de 1g a 2g em dose única.
Ceftazidima	Injetável, ampolas de 1000mg e 2000mg. Adultos: administrar 1g, por via intramuscular ou intravenosa, de 8 em 8 horas
* Somente cefalexina e cefotaxima constam na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, do Ministério da Saúde.	

Macrolídeos

Dentre os macrolídeos, vamos destacar uma medicação que é derivada da eritromicina e que, certamente, você conhece: chama-se azitromicina.

Quadro 8 – Macrolídeos

Macrolídeos	
Medicamento	**Dosagem e administração**
Azitromicina	Drágeas de 500mg; cápsulas de 500mg; comprimidos de 500mg. Comprimidos de 500mg e 1g; cápsulas de 250mg. Adultos: administrar 250mg, 500mg ou 1000mg ao dia.
Azitromicina consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, do Ministério da Saúde.	

Lincosaminas

Dentre as lincosaminas, vamos destacar a clindamicina. Observe:

Quadro 9 – Lincosaminas

Lincosaminas	
Medicamento	**Dosagem e administração**
Clindamicina	Cápsulas de 150mg e 300mg. Adultos: administrar 1 cápsula por via oral a cada 6 horas.
	Injetável, 300mg (2mL) ou 600mg (4mL) Adultos: administrar 1 ampola por via intramuscular ou intravenal a cada 6 ou 8 horas.
Clindamicina consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, do Ministério da Saúde.	

Metronidazol

O metronidazol tem grande indicação nas periodontopatias, entretanto, pode ser usado em outras infecções odontogênicas, inclusive associado com amoxicilina.

Quadro 10 – Metronidazol

Metronidazol	
Medicamento	**Dosagem e administração**
Metronidazol	Comprimidos de 250mg e 400mg. Adultos: administrar 1 comprimido por via oral a cada 8 horas.
	Injetável, 500mg (100mL). Adultos: administrar 1 ampola por via endovenosa a cada 8 horas.
Metronidazol consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename, do Ministério da Saúde.	

Observações:

1) Todos os antibióticos citados devem ser prescritos por um período de aproximadamente 7 dias, exceção feita à azitromicina que deve ser administrada em dose única diária por três a cinco dias.

2) Nos usuários alérgicos a penicilina você pode administrar azitromicina, clindamicina ou, ainda, metronidazol.

3) Nas infecções severas em usuários alérgicos a penicilina a melhor indicação é a clindamicina; já nas infecções leves a moderadas podemos usar clindamicina ou azitromicina.

4) Quando você administrar anti-inflamatório para tratar a dor, lembre-se que ele será usado por um período de tempo menor que o antibiótico. Normalmente, o controle da infecção reduz a dor.

Protocolo – Pericementite Apical Infecciosa

a) Anestesia local: quando necessária, podemos usar qualquer solução anestésica local com qualquer vasoconstritor. A adequação poderá ser feita em função do procedimento, mas, também, como visto anteriormente, de acordo com as condições sistêmicas do usuário.

b) Ajuste oclusal.

c) Medicação pós-operatória para dor:

- Dipirona sódica: comprimidos de 500mg ou solução de 500mg/mL. Dose e posologia: 1 comprimido por via oral a cada 4 horas; ou 25 a 35 gotas a cada 4 horas por, mais ou menos, 24 horas após o atendimento; ou
- Paracetamol: comprimidos de 750mg. Dose e posologia: 1 comprimido a cada 6 horas por, mais ou menos, 24 horas após o atendimento; ou
- Nimesulida: comprimidos de 100mg. Dose e posologia: 1 comprimido a cada 12 horas por 3 dias após o atendimento.

d) Medicação pós-operatória para infecção:

- Amoxicilina: cápsulas de 500mg. Dose e posologia: 1 cápsula a cada 8 horas por 7 dias; ou
- Azitromicina: comprimidos de 500mg. Dose e posologia: 1 comprimido por dia durante 3 ou 5 dias.