



Módulo  
Eventos Agudos em  
Saúde Bucal

# *Trauma de Face*

## *Anexo B*

A imunidade permanente ao tétano é conferida pela vacina com 3 doses e reforço a cada 5 ou 10 anos. Normalmente as crianças tomam a vacina (tríplice) ou apenas contra difteria e tétano. Se tudo for feito de modo correto é possível que a criança esteja imunizada contra o tétano. É possível ainda combater o tétano pela administração do soro antitetânico (SAT) e a imunidade dura 14 dias, em média 1 semana, ainda é possível obter imunidade pelo uso da imunoglobulina humana antitetânica que dura de duas a quatro semanas, em média 14 dias.

Recomenda-se o esquema vacinal completo contra o tétano a todas as pessoas ainda não vacinadas ou aquelas com esquema incompleto, independente da idade e sexo. Como o bacilo encontra-se no meio ambiente, a exposição acidental ao mesmo através de um ferimento é universal. Você está vendo que é possível que o indivíduo com trauma facial já esteja imunizado como já havia sido comentado. O esquema de vacinas no nosso caso se torna complicado, pois não temos tempo para fazer todas as doses necessárias. Assim temos que lançar mão de medidas mais rápidas para combater o bacilo, caso ele se instale na ferida. Na sequência veremos a prevenção pelo uso de vacinas que poderá ser iniciado como indicado.

### **Vacina: dT (difteria e tétano)**

Protege contra: difteria (80%) e tétano (99%)

Início da vacina: 7 anos de idade ou para pessoas de outra faixa etária que não tenham recebido o esquema básico completo e os dois reforços.

Dose: 3 doses de 0,5 mL

Via: intramuscular

Obs. De um intervalo de 60 dias entre as doses ou pelo menos 30 dias entre elas.

Reforços: 1 dose a cada 10 anos, exceto em caso de ferimento grave; antecipar o reforço se a última dose foi há mais de 5 anos.

### **Recomendações para Soroterapia**

- O soro antitetânico (SAT) é indicado para a prevenção e tratamento do tétano. A indicação depende do tipo e das condições do ferimento, bem como das informações relativas ao uso do próprio SAT e do número de doses da vacina contra o tétano (VAT) recebido anteriormente.
- A dose e o volume do SAT dependem do motivo que justificou sua vacinação. A dose profilática é de 5000 UI (para crianças e adultos) e a dose terapêutica é de 20.000 UI. A administração é intramuscular. Este soro pode ser usado em conjunto com a vacina dT.
- A imunoglobulina humana hiperimune antitetânica é indicada para o tratamento de casos de tétano, em substituição ao SAT. Temos frasco ampola de 1mL e 2 mL contendo 250 UI. A administração é intramuscular.

Diante do que foi exposto podemos concluir que a terapia antitetânica só terá indicação em alguns casos de trauma de face, como por exemplo naqueles que envolvem avulsão dental com reimplante do dente e desde que o indivíduo não esteja imunizado por vacina tomada anteriormente. Assim, de modo geral quando houver a necessidade vamos indicar o uso do soro antitetânico.