

| ANTIDEPRESSIVOS                                                                                         |                 |                         |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DROGA                                                                                                   | DOSE USUAL (MG) | FAIXA TERA-PÊUTICA (MG) | OBSERVAÇÕES                                                                                                                                        |
| Sempre iniciar o tratamento com 25 mg e aumentar 25 mg a cada 2 - 3 dias até atingir nível terapêutico. |                 |                         |                                                                                                                                                    |
| Amitriptilina                                                                                           | 150 - 200       | 50 - 30                 | Maior tendência à sedação e cardiotoxicidade. Evitar em idosos. Várias indicações na clínica médica (polineuropatia periférica, dor crônica etc.). |
| Clomipramina                                                                                            | 150 - 200       | 50 - 300                | Boa indicação também para transtornos de ansiedade. Usualmente doses menores são necessárias no transtorno obsessivo-com-pulsivo.                  |
| Imipramina                                                                                              | 150 - 200       | 50 - 300                | Observar inte-rações medica-mentosas.                                                                                                              |

| INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DA SEROTONINA |          |          |                                                             |
|--------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Citalopram                                       | 20       | 20 - 60  |                                                             |
| Escitalopram                                     | 10       | 10 - 30  |                                                             |
| Fluoxetina                                       | 20       | 5 - 80   | Meia-vida prolongada; observar inte-rações medica-mentosas. |
| Paroxetina                                       | 20       | 10 - 50  | Observar síndro-me de retirada.                             |
| Sertralina                                       | 50 - 150 | 50 - 200 |                                                             |